

Zusammenfassung der Qualitätsnormen für Pflanzkartoffeln

Merkmal	Norm (%)				Bemerkungen
Drahtwurm und Drycore bis 3 Löcher pro Knolle				20	
Sortierung - zu grosse Knollen - zu kleine Knollen	10			2 3	mit Hilfe des Quadratmasses jeweils ohne äussere Einwirkung
Diverse Mängel Erdbesatz und Fremdkörper				2	Prebasis (F1-F4), Basis (S,SE1-3,E): 1%
faule Knollen - nassfaule Knollen - trockenfaule Knollen		6	1	0,2 1	Prebasis- und Basispflanzgut total 0,5%
äussere Mängel - Missförmigkeit - mechanische und tierische Verletzungen - Drahtwurm und Drycore (> 3 Löcher pro Knolle)				3	z.B. Kindelbildung, Zwiewuchs, Wachstumsrisse z.B. Schnecken-, Mäusefrass
Schorf (<i>Streptomyces scabies</i>) - Netz- und Flachschorf - Buckel- und Tiefschorf (Abbildung in Anhang 3)			5	5 5	Knolle = befallen, wenn >1/3 der Oberfläche bedeckt ist Knolle = befallen, wenn mehr als 5 Befallsstellen vorhanden sind die nicht mehr als 20% der Oberfläche bedecken; Knollen mit mehr als 20% Befall der Oberfläche müssen aussortiert werden
Pfropfenbildung und starke Eisenfleckigkeit				3	nur durch Schneiden der Knollen beurteilbar
Pulverschorf (Abbildung in Anhang 3)				1	Knolle = befallen, wenn > 5 Pusteln Nachweis mit Test (Agri-Strip)
fremde Sorten				0.1	
Rhizoctonia - Pocken (Abbildung in Anhang 3)				20	keine Knollen mit starkem Befall; Beurteilung gemäss Abbildung in Anhang 3
Keime bis 31. Dezember 1. Januar bis 31. März				max 2 mm > 1cm	ausgenommen Apikaltrieb höchstens ein Drittel (33%) der Knollen